


# OROPHARYNGECTOMIE

## Chirurgie du fond de la gorge



Une intervention pour retirer une tumeur de l'amygdale ou du fond de la gorge

### 1. C'est quoi ?



On retire une zone malade située dans l'amygdale ou au fond de la gorge. Parfois, une partie de la langue, du voile ou de la joue est aussi concernée.

### 2. Pourquoi on le fait ?



Cette chirurgie traite une tumeur cancéreuse. Le but est d'enlever la tumeur avec sécurité. Selon les résultats, des rayons et parfois une chimiothérapie peuvent compléter le traitement.

### 3. Comment ça se passe ?



- Sous anesthésie générale
- Par la bouche, par le cou, ou plus rarement avec un geste sur la mâchoire
- Parfois retrait des ganglions du cou
- Parfois reconstruction par lambeau

### 4. Après l'intervention



- Hospitalisation souvent de plusieurs semaines
- Sonde d'alimentation temporaire
- Parfois trachéotomie temporaire
- Drains et pansements
- Douleur prise en charge

### 5. Ce qu'il faut faire



- Suivre les consignes de l'équipe
- Signaler la douleur
- Respecter les consignes d'alimentation
- Faire les soins, la kiné ou la rééducation si prescrites
- Venir aux rendez-vous de surveillance

### 6. Ce qu'il faut éviter



- Ne pas fumer
- Ne pas manger ou boire sans accord médical au début
- Ne pas tirer sur la sonde ou la canule
- Ne pas banaliser un saignement ou une gêne respiratoire
- Ne pas interrompre le suivi

### 7. Quand reconsulter rapidement ?

Appelez rapidement en cas de :



saignement



gêne respiratoire



fièvre



gonflement du cou



douleur importante



problème avec la sonde ou la canule



**Vous êtes accompagné(e) à chaque étape. L'objectif est de traiter la maladie et de préserver au mieux la respiration, la parole et l'alimentation.**

