



Adénectomie cervicale

Prélèvement d'un ganglion du cou : à quoi m'attendre ?



1. C'est quoi ?



On retire un ganglion du cou pour l'analyser.

Le but : comprendre son origine.

Infection, inflammation ou tumeur.

2. Pourquoi le faire ?



Le ganglion est augmenté de volume.

Sa cause n'est pas connue avec certitude.

L'analyse permet un diagnostic précis.

3. Comment se passe l'intervention ?



Sous anesthésie locale ou générale, selon le cas.



Petite incision au niveau du ganglion.



Le ganglion est prélevé puis envoyé en analyse.

Un drain est parfois mis en place quelques jours.

4. Après l'intervention



Une gêne ou un tiraillement sont possibles.

Un petit hématome peut survenir.

Une cicatrice au cou est normale.

Les soins et la durée d'hospitalisation sont expliqués par le chirurgien.

5. Ce qu'il faut faire / éviter

✓ À faire



Signaler vos traitements, surtout aspirine et anticoagulants.



Signaler vos allergies.



Apporter vos examens : prises de sang, imagerie...

✗ À éviter



Ne pas modifier seul vos traitements.



Ne pas oublier les consignes données avant l'intervention.

6. Quand reconsulter rapidement ?



Gonflement important ou saignement.



Rougeur, écoulement, fièvre.



Douleur importante ou qui s'aggrave.



Difficulté à avaler, à parler ou à bouger l'épaule.



À retenir



Le plus souvent, l'intervention se déroule simplement.



L'analyse du ganglion aide à comprendre la cause et à guider la suite de la prise en charge.



Votre équipe ORL est à votre écoute

