


Sous-maxillectomie : à quoi m'attendre ?

Ablation de la glande sous-mandibulaire



1. C'est quoi ?



- On retire une glande salivaire située sous la mâchoire.
- L'intervention se fait le plus souvent sous anesthésie générale.

2. Pourquoi cette opération ?



- Calculs salivaires
- Infections ou inflammation chronique
- Boule ou tumeur à analyser

3. Comment ça se passe ?



- Consultation d'anesthésie avant l'opération
- Petite incision sous la mâchoire
- Parfois analyse pendant l'intervention
- Un drain peut être mis en fin d'opération

4. Après l'opération



- Douleur souvent modérée
- Cicatrice sous la mâchoire
- Petit creux sous la mâchoire possible
- Sourire parfois un peu asymétrique au début

Le plus souvent, cela s'améliore avec le temps.

5. Ce qu'il faut faire



- Signaler vos traitements (aspirine, anticoagulants...)
- Signaler vos allergies
- Apporter vos examens médicaux
- Suivre les consignes données avant l'hospitalisation

6. Ce qu'il faut éviter



- Ne pas arrêter seul vos traitements
- Ne pas oublier vos documents médicaux
- Ne pas minimiser un gonflement important

7. Quand reconsulter rapidement ?



Saignement important



Gonflement rapide du cou



Fièvre



Douleur importante



Difficulté à avaler ou respirer



Dans la grande majorité des cas, l'intervention se passe bien.
N'hésitez pas à poser vos questions à votre ORL.

