

Submandibulectomie


À quoi s'attendre ?

1 C'est quoi ?



La submandibulectomie est l'ablation de la glande salivaire située sous la mâchoire.

On l'appelle aussi glande sous-maxillaire.



Glande sous-maxillaire (submandibulaire)

Située sous la mâchoire

2 Pourquoi la faire ?



Pour analyser une masse ou une tumeur.



Pour traiter une inflammation ou une infection chronique de la glande.

3 Comment se passe l'intervention ?

1



Anesthésie générale.

2



Petite incision sous la mâchoire.

3



Ablation de la glande.

4



Parfois analyse pendant l'opération.

5



Parfois un drain est mis en place.



En cas de tumeur maligne, un geste complémentaire sur les ganglions peut être nécessaire.

4 Ce que vous devez faire



Signaler vos traitements, surtout aspirine et anticoagulants.



Signaler vos allergies.



Apporter vos examens et prises de sang.



Suivre les consignes données pour l'hospitalisation.

5 Ce qu'il faut savoir après



La douleur est souvent modérée.



Une légère asymétrie de la lèvre peut survenir : elle est le plus souvent temporaire.



Un petit creux sous la mâchoire peut rester visible.



Une petite zone moins sensible sous la mâchoire est possible.

6 Quand reconsulter rapidement ?



Saignement important.



Gonflement rapide du cou.



Fièvre.



Douleur importante ou inhabituelle.



Difficulté à parler, avaler ou bouger la langue.



Risques rares

Très rarement, un nerf de la langue peut être irrité, avec gêne de mobilité ou de sensibilité.



À retenir

L'intervention est fréquente. Votre chirurgien vous explique chaque étape et adapte la prise en charge à votre situation.

