Dacryocystorhinostomie endonasale

Créer un nouveau passage pour les larmes



Canal lacrymal bouché

Nouveau passage des larmes vers le nez

1. C'est quoi ?

Le canal lacrymal est bouché.
Les larmes ne s'écoulent plus normalement vers le nez.
Cela peut entraîner :

- œil qui pleure
- gonflement près de l'œil
- infections répétées

2. Pourquoi ça arrive ?

La voie de drainage des larmes est obstruée.
Les larmes stagnent au lieu de s'évacuer.

3. Pourquoi opérer ?

L'intervention permet de :

- refaire passer les larmes
- diminuer le larmoiement
- éviter les infections

4. Comment se déroule l'intervention ?

Le plus souvent sous anesthésie générale.

L'intervention se fait par le nez, avec une petite caméra.

Il n'y a pas de cicatrice sur le visage.

Le chirurgien crée un passage entre la voie lacrymale et le nez.

Parfois, une petite sonde en silicone est laissée quelques semaines.

5. Après l'intervention : que faire ?

- suivre les soins prescrits
- venir aux contrôles
- moucher doucement
- éternuer bouche ouverte
- signaler vos traitements habituels (aspirine, anticoagulants)

6. Ce qu'il faut éviter

- ne pas se moucher fort
- ne pas tirer sur la sonde
- ne pas mettre de produit sans avis médical
- ne pas arrêter seul un traitement prescrit

7. Quand s'inquiéter ?

Recontactez rapidement si :

- saignement abondant
- douleur importante
- fièvre
- gonflement rouge et douloureux près de l'œil
- baisse de vision ou vision double

À retenir

Cette intervention se fait par l'intérieur du nez, sans cicatrice visible.
Elle aide les larmes à mieux s'écouler et limite les infections.