

Kyste du tractus thyroïdienne

Comprendre l'intervention


1. C'est quoi ?



Une petite poche située à l'avant du cou.

Elle est présente depuis la naissance.

Elle peut rester discrète pendant des années.



2. Pourquoi cela arrive ?

C'est un vestige du développement embryonnaire.

Il se situe sur le trajet de la thyroïde.



3. Pourquoi l'enlever ?



Il ne disparaît pas tout seul



Il peut grossir ou s'infecter



Il peut former un abcès ou une fistule

4. Comment se passe l'intervention ?



Anesthésie générale



Petite incision horizontale au cou



Retrait du kyste, du trajet et d'un petit fragment de l'os hyoïde



Parfois un drain pendant 24 à 48 h

5. Après l'opération



Pendant quelques jours :

- gêne pour avaler
- cou un peu sensible

Des médicaments contre la douleur sont prescrits.



6. À faire



Signaler vos traitements (surtout aspirine / anticoagulants)



Apporter vos examens



Suivre les consignes du chirurgien

À éviter



Négliger une rougeur ou une augmentation de volume



Attendre en cas de douleur importante



Prendre de l'aspirine sans avis médical

7. Quand reconsulter rapidement ?



Gonflement rapide du cou



Saignement



Fièvre



Plaie rouge, douloureuse ou qui coule



Gêne respiratoire



Réapparition d'une boule



Le plus souvent, cette chirurgie se déroule bien. L'équipe ORL vous accompagne à chaque étape.

