

Kyste ou fistule de la 2^e fente branchiale chez l'enfant

L'opération : à quoi s'attendre ?

1 C'est quoi ?

C'est une petite anomalie présente depuis la naissance, sur le côté du cou.

Elle peut prendre la forme :

- d'un kyste = une poche remplie de liquide
- d'une fistule = un petit canal qui peut s'ouvrir à la peau



2 Pourquoi ça arrive ?



Cela vient du développement du cou avant la naissance.



Ce n'est pas de votre faute.



Cette anomalie peut s'infecter, gonfler ou couler plusieurs fois.



3 Ce que l'on fait

- L'intervention retire le kyste ou tout le trajet de la fistule.
- Elle se fait sous anesthésie générale.
- Une consultation d'anesthésie est nécessaire avant.
- Le but : éviter les infections, les écoulements et les récives.



4 Après l'opération

- Une cicatrice sur le côté du cou est normale.
- Il peut y avoir un peu de douleur ou un petit hématome.
- Une baisse de sensibilité du pavillon de l'oreille du côté opéré est parfois possible, souvent transitoire.
- Le chirurgien vous explique les soins et la durée d'hospitalisation.



5 Quand reconsulter ?



gonflement important



saignement



fièvre



rougeur ou écoulement de la cicatrice



douleur qui augmente



À retenir

- ✓ Cette opération est fréquente en chirurgie ORL pédiatrique.
- ✓ Elle permet surtout d'éviter les infections répétées.
- ✓ Votre chirurgien reste disponible pour répondre à vos questions.

