



# Kyste ou fistule de la 4<sup>e</sup> poche branchiale chez l'enfant


Comprendre l'intervention simplement



## 1. C'est quoi ?



- C'est une petite malformation présente depuis la naissance.
- Elle forme un kyste ou une fistule dans le cou.
- Elle peut s'infecter près de la thyroïde.



## 2.



### Pourquoi opérer ?

- Pour fermer l'orifice de la fistule.
- Pour éviter les infections à répétition.
- Pour diminuer le risque de douleur, gonflement ou gêne respiratoire.

## 3. Comment se passe l'intervention ?



- Anesthésie générale.
- Le chirurgien passe par la bouche.
- Un tube rigide permet de voir le larynx.
- L'orifice est fermé par cautérisation.
- Pas de cicatrice visible sur le cou pour ce geste.

### Intervention endoscopique laryngo-trachéale



## 4. Après l'intervention



Retour à la maison selon les consignes du chirurgien.



Mal de gorge ou gêne pour avaler pendant quelques jours : possible.



Petites douleurs du cou ou irritation de la lèvre / langue : possible.



Parfois, une 2<sup>e</sup> intervention est nécessaire si la fistule se rouvre.

## 5.

### Quand reconsulter ?



- Respiration difficile
- Gonflement important
- Douleur importante
- Fièvre ou signes d'infection
- Si l'enfant va moins bien



**En cas de doute, recontactez l'ORL.**



**À ne pas oublier avant l'intervention**



Signaler les traitements habituels (surtout aspirine).



Signaler les allergies.



Apporter les examens déjà réalisés.



Le plus souvent, cette prise en charge se déroule bien et permet d'éviter les récurrences infectieuses.

