

# Kyste ou fistule de la 1<sup>re</sup> fente branchiale chez l'enfant

Comprendre l'intervention simplement


## 1 Qu'est-ce que c'est ?

C'est une anomalie présente dès la naissance.

Elle peut former :

- un petit canal qui s'ouvre à la peau = **fistule**
- une petite poche remplie de liquide = **kyste**

Elle se situe près du haut du cou, de la parotide ou du conduit auditif externe.



## 2 Pourquoi l'opérer ?

Cette anomalie peut s'infecter.

Si elle s'infecte, l'opération devient plus délicate.

L'objectif est de l'enlever avant si possible.



## 3 Comment se passe l'intervention ?

- opération sous anesthésie générale
- consultation d'anesthésie avant
- ablation du kyste ou de la fistule
- durée d'hospitalisation expliquée par le chirurgien



## 4 Avant l'intervention : à faire

Signaler :

- les traitements habituels
- surtout l'aspirine
- les allergies



Apporter les documents médicaux : prises de sang, radios, examens.

## 5 Après l'intervention : ce qui peut arriver

### ✓ Le plus souvent

- douleur modérée
- gêne pour mâcher
- douleur du cou
- petite baisse de sensibilité de la joue ou de l'oreille
- petit hématome possible



### ⚠ Plus rarement

- infection locale
- faiblesse d'un côté du visage, le plus souvent temporaire
- cicatrice sensible pendant quelques mois
- récurrence rare



La paralysie faciale définitive est exceptionnelle.

## 6 Quand reconsulter rapidement ?

- saignement important
- gonflement important
- fièvre
- rougeur ou douleur qui augmente
- écoulement
- asymétrie du visage
- œil rouge, douloureux ou qui ferme mal



En cas de doute, contactez votre chirurgien.



## À retenir

Cette intervention est réalisée pour éviter les infections et retirer l'anomalie en toute sécurité.



Votre équipe ORL reste disponible pour répondre à vos questions.