


Amygdalectomie adulte

Ablation des amygdales



Amygdales



Une intervention fréquente pour mieux respirer, avaler ou limiter les infections répétées.



1. C'est quoi ?

Les amygdales sont situées au fond de la gorge, de chaque côté de la luette.



L'amygdalectomie consiste à les retirer.



L'intervention se fait par la bouche, sous anesthésie générale.

2. Pourquoi l'opération ?

- Angines à répétition
- Amygdales trop volumineuses
- Gêne pour respirer
- Gêne pour avaler
- Complications infectieuses



3. Comment ça se passe ?



Consultation d'anesthésie avant l'opération.



Le chirurgien passe les instruments par la bouche.



Après l'opération, la gorge cicatrise en 8 à 15 jours.



Un enduit blanchâtre dans la gorge est habituel pendant la cicatrisation.

4. Ce qui est habituel après

- Mal de gorge important
- Douleur dans les oreilles
- Déglutition douloureuse
- Haleine forte
- Enduit blanc dans la gorge
- Quelques crachats rosés possibles



Ces signes sont fréquents pendant la cicatrisation.

5. Ce qu'il faut faire



Prendre les antalgiques prescrits



Boire régulièrement



Reprendre une alimentation adaptée dès que possible



Surveiller que vous arrivez à boire et à manger



Suivre les consignes du chirurgien

6. Quand s'inquiéter ?

- Tout saignement rouge doit être signalé rapidement
- Hémorragie possible surtout entre J8 et J15
- Difficulté importante à boire ou à manger
- Signes de déshydratation
- Fièvre ou aggravation inhabituelle



En cas de saignement, contactez rapidement le chirurgien ou les urgences.



À retenir



Intervention fréquente



Cicatrisation en 8 à 15 jours



La douleur est habituelle



Le point le plus important : bien boire et signaler tout saignement