


Amygdalectomie intracapsulaire chez l'enfant

À quoi s'attendre après l'opération ?

1 C'est quoi ?



- On réduit le volume des amygdales.
- On garde une fine couche protectrice.
- L'intervention se fait par la bouche, sous anesthésie générale.

2 Pourquoi ?



Amygdales trop grosses.

Ronflements ou pauses respiratoires.

Gêne pour respirer ou avaler.

Parfois infections à répétition.

3 Après l'opération : c'est souvent normal



Mal à la gorge pendant quelques jours.

Douleur dans les oreilles : fréquent.

Dépôt blanc dans la gorge : normal.

Petits crachats rosés possibles au début.

4 Ce qu'il faut faire



Donner les antidouleurs comme prescrits.

Faire boire souvent.

Proposer une alimentation froide, molle ou tiède.

Favoriser le repos.

Reprise progressive de l'alimentation.

5 À éviter



Éviter les aliments trop chauds, durs ou irritants.

Éviter les efforts physiques intenses les premiers jours.

Ne pas donner de médicament non prévu sans avis médical.

6 Quand s'inquiéter ?



Tout saignement rouge par la bouche ou le nez = **urgence**.

Enfant qui ne boit presque plus.

Vomissements de sang.

Fièvre, douleur ou état général qui s'aggrave.

Difficulté à respirer.



Dans ces cas : contactez rapidement le chirurgien ou consultez en urgence.



La douleur et le dépôt blanc sont habituels.
En cas de saignement, même minime, il faut prévenir rapidement.

